


Día nacional de la prueba del VIH

el 27 de junio

El Día Nacional de la prueba del VIH está dedicado a estimular a las personas a que sepan su estado de VIH y a ayudar a aquellas personas que son positivas a brindarles acceso al tratamiento y a reducir su riesgo de transmitir el VIH a otros.

Se estima que hay 1,2 millones de personas que viven con el VIH en los Estados Unidos.




En el 2016, un 15% de las personas con VIH en los Estados Unidos desconocían su estado y esto representó el 38% de nuevas transmisiones de VIH.

Las personas diagnosticadas temprano y que continúan con el tratamiento del VIH pueden vivir vidas largas y saludables con el VIH.

En 2018, el 21% de las personas recién diagnosticadas con VIH fueron diagnosticadas con SIDA dentro de un período de 3 meses a su diagnóstico de VIH.

Estas personas son consideradas como las que se hicieron las pruebas tarde. Cuanto antes se diagnostica a una persona con VIH, más fuerte será su sistema inmunológico y mejor será su respuesta al tratamiento antirretroviral.

Pruebas de detección del VIH y del COVID-19





Todavía pueden hacerse la prueba de detección del VIH durante el COVID-19. El uso de la mascarilla es una medida necesaria para su protección personal y para la del proveedor que realizará la prueba. Cada centro tendrá protocolos adicionales, como el distanciamiento físico y el uso del gel antibacterial. Estas medidas existen para mantenerlo seguro.

¿Quiénes deberían hacerse la prueba del VIH?

Todas las personas entre 13 y 64 años deben hacerse la prueba del VIH por lo menos una vez. Si está embarazada o planea quedar embarazada, hágase la prueba lo antes posible.

Hágase la prueba del VIH por lo menos una vez al año si:

-  Mantiene relaciones sexuales con una persona que vive con el VIH
-  Mantiene una vida sexual activa con hombres gays o bisexuales



Comparte agujas para inyectarse drogas.



Si es una mujer transgénero sexualmente activa



Ha sido diagnosticado (-a) o tratado (-a) por otra infección de transmisión sexual

Día de la prueba del VIH en Luisiana el 27 de junio


De las 25.300 personas que viven con el VIH en Luisiana,



el 82% ha sido diagnosticada.

En el 2019, **902** personas fueron diagnosticadas con el VIH en Luisiana.

En Luisiana, los residentes negros se ven más afectados por el HIV que cualquier otro grupo.



1 de cada 3 residentes en Luisiana es negro.



2 de cada 3 diagnósticos nuevos del VIH son de personas negras

El 65% de las personas que vive con el HIV diagnosticado en Luisiana se encuentran con supresión viral.

Alcanzar la supresión viral significa tener lo a un nivel muy bajo en la sangre. Personas con la supresión viral no se puede transmitir el VIH a parejas sexuales.

La nueva normalidad. La nueva manera. El mismo PrEP.

Obtenga el PrEP con más facilidad que antes con el programa de TelePrEP.



1. Inscríbese por su cuenta o por teléfono con la ayuda de un orientador para pacientes.



2. Hágase la prueba en un laboratorio más cercano.



3. Complete la evaluación médica con nuestro personal clínico.



4. Obtenga sus medicinas.



Llame/Texto:
504-877-2464



Conoce tu condición. Hazte la prueba del VIH. Para más información sobre los centros de pruebas más cercanos ve al:

 www.lahhub.org

 [@lahealthhub](https://www.instagram.com/lahealthhub)