#MiVozMiAcción

1 de diciembre

Alrededor del mundo



En 2020, se estima que 38 milliones de personas vivían con HIV.



Desde el comienzo de la epidemia, se estima que unas **36,3 milliones** de personas han fallecido por enfermedades relacionadas al SIDA.




Se estima que **1,5 milliones** de personas fueron diagnosticadas con el VIH en el 2020, **una disminución del 52% desde que los diagnósticos alcanzaron su punto máximo en 1997.**


VIH y SIDA en los Estados Unidos

- Hay más de un millón de estadounidenses que viven con el VIH.
- En el 2019, casi 37,000 personas fueron diagnosticadas con VIH.
- En el 2019, más de 16,000 personas fueron diagnosticadas con SIDA.


La epidemia del VIH afecta a algunos grupos de personas más que a otros, entre ellos a:



afroamericanos y latinos/hispanos



hombres gais y bisexuales




las personas que viven en el sur de los Estados Unidos

Hay muchos factores que contribuyen tanto al riesgo que una persona contraiga el VIH, al igual que a la salud en general. Entre estos factores se encuentran:




La educación




El acceso a la salud



Discriminación y estigma



El empleo



El apoyo familiar y comunitario



Un hogar seguro y estable

Encontrar maneras en que se les pueda garantizar servicios de salud de calidad, es importante para la salud de todas las personas.





VIH y SIDA en Luisiana



En el 2020 hubo **725 diagnósticos nuevos en Luisiana.** Esto representa el número más bajo de diagnósticos desde que la epidemia alcanzó su punto más alto en 1992.

Se estima que 1 de 6 personas que vive con el VIH en Luisiana no están diagnosticadas y desconocen su estado de VIH.






En el 2020, 22,136 personas vivían con el VIH en Luisiana.

Más de la mitad de las personas que viven con el VIH habían sido ya previamente diagnosticados con SIDA.


Entre las personas que vivían con el VIH en el 2020:



2 de 3 eran afroamericanos



el 70% eran hombres





la mitad era más de 45 años

Qué puede hacer usted para prevenir la transmisión del VIH:

Si vives con el síndrome del VIH, toma tus medicamentos para el VIH para mantenerte saludable y reducir el riesgo de pasárselo a tu pareja.

Conoce tu estado y el de tu pareja. Hágase la





Si eres VIH negativo, habla con tu médico sobre la profilaxis preexposición (PrEP), una píldora diaria para prevenir el VIH.



Usa condones correctamente cada vez que tengas sexo oral, anal o vaginal.

Hazte la prueba y busca tratamiento para otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Evita el intercambio de agujas y otros equipos de inyección.

Para más información sobre los centros de pruebas más cercanos ve al: lahhub.org