



Día nacional de concientización sobre el VIH/SIDA entre hombres gais y bisexuales

El 27 de Septiembre



En el 2020, había **un millón**


personas que vivían con VIH en los Estados Unidos.



El 67%

de hombres gais y bisexuales que viven con VIH en los Estados Unidos han alcanzado

la supresión del virus.



En el 2020, en los Estados Unidos, **2 de 3 nuevos diagnósticos de VIH se encontraban entre hombres gais y bisexuales.**

gais y bisexuales.



Los hombres gais y bisexuales deben hacerse la prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más frecuencias cada 3-6 meses.



Utilice un condón correctamente cada vez que sostenga relaciones sexuales para protegerse del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual.



Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu médico sobre la **PrEP**. Una píldora diaria para prevenir el VIH.

Más de la mitad


de las personas que viven con VIH en los Estados Unidos eran **hombres gais y bisexuales.**



Indetectable = Intrasmisible
#IequivaleaI

Aquellas personas con VIH que toman sus medicamentos como se les indica y mantienen la supresión del virus o es indetectable, no les pueden transmitir el VIH a sus parejas sexuales.


La mayoría los hombres gais y bisexuales diagnósticos de VIH son **negros o hispanos/latinos.**



VIH entre hombres gais y bisexuales en Luisiana



Más de la mitad de las personas que vivía con VIH en Luisiana en el 2021 era **hombres gais y bisexuales.**



Entre los hombres gais y bisexuales que viven con VIH en Luisiana...

El **29%** era menor de 35 años.

El **57%** era negros, el **35%** era blancos.


El **71%** habían alcanzado la supresión del virus.

Alcanzar la supresión viral significa tener lo a un nivel muy bajo en la sangre. Personas con la supresión viral **no se puede** transmitir el VIH a parejas sexuales.



Durante los últimos 10 años, el porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH entre hombre gais y bisexuales ha aumentado del 48% en el 2012 al 60% en el 2021.

Entre los nuevos diagnósticos de VIH en el 2020 en Luisiana, **el 61% era hombres gais y bisexuales (HGB) y un 4% adicional era hombres gais y bisexuales que se inyectan con drogas.**



El **41%**

HGB diagnosticados con el VIH eran **20 a 29 años.**

El **60%**

HGB diagnosticados con el VIH eran **negros.**



Los hombres gais y bisexuales deben hacerse la prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más frecuencias cada 3-6 meses.



Utilice un condón correctamente cada vez que sostenga relaciones sexuales para protegerse del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual.



Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu médico sobre la **PrEP**. Una píldora diaria para prevenir el VIH.

Para localizar los centros de pruebas e información sobre el VIH u otra infección de transmisión sexual ve al:



www.lahhub.org



@lahealthhub