



Día nacional de concientización sobre el VIH/SIDA entre hombres gais y bisexuales

El 27 de Septiembre



Más de la mitad



de las personas que viven con VIH en los Estados Unidos eran **hombres gais y bisexuales.**



En el 2021, había

un millón

personas que vivían con VIH en los Estados Unidos.



El 69%


de hombres gais y bisexuales que viven con VIH en los Estados Unidos han alcanzado

la supresión del virus.

La ciencia está ahí:
Indetectable = Intrasmisible
I=I

Si tienes el VIH, tomar tus medicinas y mantener una carga viral indetectable significa que



no puedes transmitir el VIH a tus parejas sexuales.



En el 2021, en los Estados Unidos, **2 de 3 nuevos diagnósticos de VIH se encontraban entre hombres gais y bisexuales.**



La mayoría los hombres gais y bisexuales diagnósticos de VIH son **negros o hispanos/latinos.**



Los hombres gais y bisexuales deben hacerse la prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más frecuencias cada 3-6 meses.



Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu médico sobre la **PrEP**, una píldora diaria para prevenir el VIH.




Utilice un **condón** correctamente cada vez que sostenga relaciones sexuales para protegerse del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.

VIH entre hombres gais y bisexuales en Luisiana



Casi la mitad de las personas que vivía con VIH en Luisiana en el 2022 era **hombres gais y bisexuales**.



Entre los hombres gais y bisexuales que viven con VIH en Luisiana...

El 30% era menor de 35 años.

El 58% era negros, el **33%** era blancos.


El 69% habían alcanzado la supresión del virus.

Alcanzar la supresión viral significa tener lo a un nivel muy bajo en la sangre. Personas con la supresión viral **no se puede** transmitir el VIH a parejas sexuales.



Durante los últimos 10 años, el porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH entre hombre gais y bisexuales ha aumentado del 55% en el 2013 al 62% en el 2022.

Entre los nuevos diagnósticos de VIH en el 2020 en Luisiana, **el 62% era hombres gais y bisexuales (HGB)** y un **4%** adicional era **hombres gais y bisexuales que se inyectan con drogas**.




El 42%

de HGB diagnosticados con el VIH eran **20 a 29 años**.

El 64%

de HGB diagnosticados con el VIH eran **negros**.



Los hombres gais y bisexuales deben hacerse la prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más frecuencias cada 3-6 meses.



Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu médico sobre la **PrEP**, una píldora diaria para prevenir el VIH.



Utilice un condón correctamente cada vez que sostenga relaciones sexuales para protegerse del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.

Para localizar los centros de pruebas e información sobre el VIH u otra infección de transmisión sexual ve al:



www.lahhub.org



@lahealthhub